



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
 भारत मौसम विज्ञान विभाग  
 उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.  
 नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 24-01-2023

सोलन(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-01-24 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-01-25	2023-01-26	2023-01-27	2023-01-28	2023-01-29
वर्षा (मिमी)	15.0	10.0	0.0	0.0	3.0
अधिकतम तापमान(से.)	16.0	18.0	18.0	19.0	16.0
न्यूनतम तापमान(से.)	3.0	3.0	3.0	6.0	4.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	91	88	66	46	49
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	42	58	32	20	20
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.6	9.4	7.6	7.8	7.0
पवन दिशा (डिग्री)	90	68	70	68	70
क्लाउड कवर (ओक्ट)	6	2	0	3	4

### मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले पांच दिनों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 24 से 25 जनवरी, 2023 तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 16.0-19.0°C और 3.0-6.0°C के बीच रहेगा। हवा की गति उत्तर-पूर्व दिशा में 7.0-9.4 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता में 20-91 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव रहेगा।

### सामान्य सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत में कीट और रोगों के हमले के खिलाफ सब्जियों की फसलों की नियमित निगरानी करें। मध्यम वर्षा वाले दौर में सिंचाई के प्रयोग से बचें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए उचित व्यवस्था करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों में पानी के ठहराव से बचने के लिए उचित जल निकासी चैनल बनाएं। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुशाला की समुचित व्यवस्था की जाए। अगले दिन के मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे

अपने खेतों में फसल संचालन करें। स्थानीय भाषा में कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेघदूत ऐप का उपयोग करें।

### लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सभी फसलों में सिंचाई के आवेदन को रोक दें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसानों को गेहूँ की फसल में गुल्ली डंडा खरपतवार के संक्रमण की निगरानी करने की सलाह दी जाती है। संक्रमण की स्थिति में, पहली सिंचाई के बाद बुवाई के 30-35 दिनों तक 160 ग्राम टोपिक 15 डब्ल्यूपी (क्लोडिनाफॉप) / 400 मिली एक्सियल 5 ईसी (पिनोक्साडेन *) को 150 लीटर पानी में मिलाकर पहली सिंचाई के बाद छिड़काव करें। गेहूँ की फसल में पीले रतुआ के प्रकोप से निगरानी करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेब	मौसम साफ होने पर किसानों को सेब के पेड़ों की छंटाई करने की सलाह दी जाती है। मौसम साफ और शुष्क होने पर फंगल संक्रमण से बचने के लिए टूटी हुई या छँटी हुई शाखाओं के कटे सिरों पर बोर्डो पेस्ट लगाएं।
गोभी	एफिड्स और गोभी तितली के हमले से फसल की निगरानी करें। हमले की स्थिति में मैलाथियान 1 मि.ली./ लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।
मटर	फसल की संभावित उपज के लिए पौधों को झांके लगाकर पर्याप्त सहारा दें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बछड़ों को रात के समय जूट के बोरे से ढक कर ठंड से बचाएं और दिन के समय कुछ देर धूप में बिठाएं। पशुशाला के शेड के अंदर ठंडी हवा के मार्ग को कम करने के लिए चादरों का उपयोग करें क्योंकि पशुशाला के शेड के अंदर ठंडी हवा का प्रवेश पशुओं के दूध उत्पादन को प्रभावित करता है। शेड के अंदर नमी बनाए रखने के लिए उचित वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां दिन के समय खुली रखें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	प्राकृतिक खेती में, नमी बनाए रखने और फसलों में खरपतवार के विकास को दबाने के लिए

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
	खेत में सब्जियों की फसलों की दो कतारों के बीच मल्लिचिंग की जा सकती है।