



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग

उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.

नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-04-2024

सोलान(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2024-04-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2024-05-01	2024-05-02	2024-05-03	2024-05-04	2024-05-05
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	31.0	32.0	32.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	10.0	14.0	15.0	15.0	16.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	80	79	82	80	79
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	24	23	27	25
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10	10	10	7	11
पवन दिशा (डिग्री)	89	357	357	52	13
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले पांच दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29.0-32.0°C और 10.0-16.0°C के बीच रहेगा। उत्तर-पूर्व दिशा में हवा की गति 7.0-11.0 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता 23-80 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव होगी।

सामान्य सलाहकार:

मौजूदा मौसम की स्थिति में नए कीटों के उद्भव के लिए फसल की नियमित निगरानी करें। किसानों को ग्रीष्मकालीन सब्जियों की सीधी बुआई की सलाह दी जाती है क्योंकि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। फसल आधारित कृषि सलाह का नियमित रूप से पालन करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेतों में निराई और गुड़ाई करें। रबी फसल की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई करें। साफ़ मौसम के दौरान पौधों की सुरक्षा के उपाय लागू करें। स्थानीय भाषा में कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए MEGHDOOT ऐप का उपयोग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

फसल की आवश्यकता के अनुसार नियमित रूप से सिंचाई करें।

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसानों ने गेहूँ की कटाई और मड़ाई का काम पूरा कर लिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। जिन किसानों के पास फसल की कटाई बची है वे कटाई कर सकते हैं क्योंकि मौसम साफ और शुष्क रहेगा।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेब	सेब की फसल फूल अवस्था में है, परागण में सुधार के लिए बगीचों में प्रति 5 बीघे में 2-3 मधुमक्खी कॉलोनी बॉक्स रखने की सलाह दी जाती है।
आम	नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। तौलियों को खरपतवार से मुक्त रखें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए पौधे के तौलियों में लगभग 10 सेमी मोटाई में पुआल गीली घास फैलाएं। मिली बग और मेंगो हॉपर के हमले को रोकने के लिए फलों के पेड़ों की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। कीट आमतौर पर पुष्पक्रम और पत्तियों से रस चूसते हैं। आम के पौधों पर मिली बग की ऊपर की ओर गति को नियंत्रित करने के लिए चिपचिपा ग्रीस बैंड लगाएं।
टमाटर	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेतों में टमाटर की पौध की रोपाई करें।
सेम की फली	किसानों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई अच्छे से तैयार खेतों में करें। बेहतर अंकुरण के लिए बीज को बोने से पहले रात भर पानी में भिगोएँ।
लहसुन	कटाई के 10-15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। 50% गर्दन गिरने के बाद फसल की कटाई करनी चाहिए। यदि फसल गर्दन गिरने की अवस्था में है और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दुधारू पशुओं को दूध उत्पादन बढ़ाने और पेट फूलना (अफारा) से बचाने के लिए अन्य हरी घासों के साथ मक्का, ज्वार और बाजरा आदि जैसे हरे चारे की घास प्रदान करें। पशुशाला में उचित स्वच्छता बनाए रखें। खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) के खिलाफ टीका लगवाएं।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मौसम साफ और धूप होने पर साप्ताहिक अंतराल पर 3.0 प्रतिशत की दर से अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमास्त्र तथा दशपर्णी अर्क और 10.0 प्रतिशत की दर से जीवाअमृत का छिड़काव करके कीट-कीटों के हमले को नियंत्रित कर सकते हैं। खटी लस्सी का छिड़काव फसल को फंगल हमले से बचाता है