



Gramin Krishi Mausam Sewa

District Level Agromet Advisory Bulletin
Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture & Forestry
Nauni Solan, Himachal Pradesh



(Project Sponsored by IMD, Ministry of Earth Sciences, Govt. of India)

Agromet Advisory Bulletin

Date : 18-09-2020

Weather Forecast of SOLAN(Himachal Pradesh) Issued On : 2020-09-18(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-09-19	0.0	32.0	18.0	59	27	9.0	68	0
2020-09-20	0.0	31.0	18.0	53	28	9.0	65	0
2020-09-21	0.0	31.0	17.0	47	22	9.0	65	0
2020-09-22	0.0	31.0	17.0	53	26	9.0	70	0
2020-09-23	0.0	31.0	17.0	74	42	9.0	69	0

Weather Summary/Alert:

In next five days weather will remain mainly dry, sky will be cloudy. Maximum temperature 31-32°C & minimum temperatures 17-18 °C is expected .Relative humidity will remain between 22 to 74 per cent and wind speed between 6-7 km/h from NE direction.

अगले पांच दिनों में मौसम शुष्क रहने तथा आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 29-30 °C और न्यूनतम तापमान 18-19 °C होने की संभावना है। आर्द्रता 36 से 81 प्रतिशत और हवा की गति NE दिशा से 6-7 किमी / घंटा के बीच बनी रहेगी।

General Advisory:

To control the stem borer in temperate fruit trees clean the borer with a soft wire and put a piece of cotton dipped in petrol or Mithyal perthion in the hole and close the hole by putting clay soil .

समशीतोष्ण फलों के पेड़ों में स्टेम बोरर को नियंत्रित करने के लिए बोरर को नरम तार से साफ करें और छेद में पेट्रोल या मिथाइल पेरेथियन में डूबा हुआ कपास का एक टुकड़ा डालें और मिट्टी डालकर छेद को बंद करें।

SMS Advisory:

After harvest of crops collect soil samples for getting them tested fertilizers management should be done on soil testing basis at least once in three years.

फसलों की कटाई के बाद मृदा के नमूने लेकर परीक्षण किए गए उर्वरकों का प्रबंधन तीन साल में कम से कम एक बार मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए।

Horticulture/vegetables Specific Advisory:

Horticulture/vegetables (Varieties)	Horticulture/vegetables Specific Advisory
BOTTLE GOURD	<p>Harvest the crop 15 days after spray. In crops like Gourds, tomato etc. to control the fruit fly attack spray with 10 gram jaggery +2ml melathion per litre of water.</p> <p>स्प्रे के 15 दिन बाद फसल की कटाई करें। लौकी, टमाटर आदि फसलों में फलों के मक्खी के हमले से बचाव के लिए 10 ग्राम गुड़ + 2 मिली मेलाथियान प्रति लीटर पानी के साथ स्प्रे करें</p>
APPLE	<p>In temperate fruits like apple etc. Spray 1% Urea (2kg/200 L) after the fruit harvesting. To control the Canker disease mix 600g Copper Oxichloride in this solution. Ripened persimmon may be harvested and send to the market. For establishing new orchards it is right time to plan layout.</p> <p>समशीतोष्ण फलों जैसे सेब आदि में फलों के तुड़ान के बाद 1% यूरिया (2 किग्रा / 200 ली) का छिड़काव करें। कैंकर रोग को नियंत्रित करने के लिए 600 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड घोल में मिलाएं। persimmon को तुड़ान कर बाजार में भेजे। नए बाग स्थापित करने के लिए ले आउट की योजना बनाने का सही समय है।</p>