



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के डॉ। वाई.एस.
 नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 06-06-2023

सोलन(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-06-06 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-06-07	2023-06-08	2023-06-09	2023-06-10	2023-06-11
वर्षा (मिमी)	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	31.0	32.0	32.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	86	89	80	85	86
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	80	78	78	78
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11	11	11	10	11
पवन दिशा (डिग्री)	56	56	63	292	22
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले पांच दिनों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 6 और 7 जून, 2023 को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों तक आसमान साफ से बादलों से घिरा रह सकता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30.0-32.0°C और 17.0-18.0°C के बीच रहेगा। हवा की गति उत्तर-पूर्व दिशा में 10.0-11.0 किमी प्रति घंटे के बीच रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता में 78-89 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव रहेगा।

सामान्य सलाहकार:

वज्रपात और आकाशीय बिजली से सावधानी बरतें किसानों को खुले मैदान में जाने से बचने की सलाह दी जाती है। ऊँचे पेड़ों या अन्य वस्तुओं से दूर रहें। फलदार वृक्षों की घाटियों को खरपतवारों से मुक्त रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कीट/बीमारियों के हमले के खिलाफ सब्जी फसलों की नियमित निगरानी करें। फसल आधार कृषि सलाह का नियमित रूप से पालन करें। स्थानीय भाषा में कृषि मौसम संबंधी सलाह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेघदूत ऐप का उपयोग करें।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को फसलों की आवश्यकता के अनुसार नियमित अंतराल पर सिंचाई करने की सलाह दी जाती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	घाटियों को खरपतवारों से मुक्त रखें। मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए पौधे के तोलियों में लगभग 10 सेमी मोटी घास मलच फैलाएं। मीली बग और मेंगो होपर के हमले को रोकने के लिए फलों के पेड़ों की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। मेंगो मीली बग की ऊपर की ओर गति को नियंत्रित करने के लिए आम के पौधों पर चिपचिपा ग्रीस बैंड लगाएं।
सेब	सेब के पपड़ी रोग के हमले को रोकने के लिए फलों के पेड़ों की लगातार निगरानी की जानी चाहिए।
टमाटर	टमाटर के परिपक्व फलों की समय पर तोड़ाई करें। फल और तना छेदक के हमले को रोकने के लिए फसल की लगातार निगरानी की जानी चाहिए।
बैंगन	फल और तना छेदक के हमले को रोकने के लिए फसल की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। वर्तमान स्थिति में फल और तना छेदक का प्रकोप अधिक होने के कारण, छेदक से संक्रमित टहनियों/ फलों को काटकर मिट्टी में दबा दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुशाला के आसपास पानी के ठहराव से बचने और पशुशाला के अंदर गीलेपन से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। पशुशाला में उचित स्वच्छता बनाए रखें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौधे - संरक्षण	पुआल मलच प्राप्त करें और सभी फसलों के चारों ओर मलच की एक परत फैलाएं। यह बारिश के पानी को घुसने में धीमा कर देता है और मध्यम से भारी वर्षा के दौरान मिट्टी और जड़ की क्षति को रोकने में मदद करता है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मौसम साफ और धूप होने पर अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमस्त्र और दशपर्णी अर्क @3.0 प्रतिशत और जीवामृत @ 10.0 प्रतिशत साप्ताहिक अंतराल पर छिड़काव करके कीट के हमले को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान उपरोक्त सलाह का पालन कर सकते हैं, और अन्य किसान प्रथाओं के पैकेज में अनुशंसित प्रबंधन प्रथाओं का पालन कर सकते हैं।